Cribado de cáncer colorrectal mediante el test de sangre oculta en heces

Número de eventos esperables (aplicando los resultados de la evaluación GRADE^(*) a los riesgos basales de España) en españoles de 50 a 59 años que participasen o no en un programa de cribado bienal, durante 12 años de seguimiento.

Beneficios	1.000 personas sin cribado	1.000 personas con cribado
Muertes por cualquier causa	51	51
Muertes por cáncer colorrectal	3	2
Casos de cáncer colorrectal	10	10
Daños asociados a los falsos positivos		
Falsos positivos si se utiliza el test de guayaco		180
Personas experimentaron una complicación mayor derivada de la intervención de la colonoscopia (hemorragia mayor, perforación)		0,36
Distrés psicológico asociado a un falso positivo (conocimiento aún impreciso por pruebas experimentales todavía no consistentes)		Variable intensidad que dura entre 0 y 120 días


^(*) Fuente: Mateo-Cotera A, Sánchez-Robles GA, Montaño-Barrientos A, Martín-Nava MA, Álvarez-Cienfuegos A, Gómez-Santana MC, Candela-Marroquín E. Revisión GRADE del cribado de Cáncer Colorrectal mediante test bienal de sangre oculta en heces. [Actualizada a 31-Mar-2017]. Página web evalmed.es, 26-mayo-2017. Disponible en: evalmed.es.


Muertes por todas las causas en 12 años


Edad: 50-59 años


CON CRIBADO

SIN CRIBADO










Muertes por Cáncer Colorrectal en 12 años


Edad: 50-59 años

CON CRIBADO

SIN CRIBADO







3 Mueren por CCR por cada 1000 usuarios

997 No mueren por CCR por cada 1000 usuarios

Casos de Cáncer Colorrectal en 12 años

Edad: 50-59 años

CON CRIBADO

SIN CRIBADO

